

Aizsargiepakoējuma marķējums

**Nuance® 75 WG**  
**Herbicīds**

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Latvāņa ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.

**Darbīgā viela:** metil-tribenurons, 750 g/kg  
**Preparatīvā forma:** disperģējošas granulas  
**Reģistrācijas Nr. 0403**  
**Reģistrācijas klase: 2**  
**Iepakojums:** 8 x 100 g; 12 x 100 g; 8 x 250 g; 12 x 500 g  
**Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma**  
**Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma**

**APSTIPRINU**  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja  
R. Čūdere  
2019. g. 16. oktobrī



**Uzmanību**

**SAŅEMTS Nr. 867**  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļā  
2019. g. 16. oktobrī

- |        |  |
|--------|--|
| H410   | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  |
| EUH208 | Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.   |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.  |
| P391   | Savākt izšļakstīto šķidrumu.   |
| P501   | Atbrīvojoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.   |
| SP1    | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.   |
| SPe 3  | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.   |
| SPe 3  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana**

Preparāts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā un aizslēdzamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0° līdz +35°C.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:** Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija. Konsultācija Latvijā 27734868

**Ražotājs, tā adrese:** Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dānija  
Tel. 00 45 96909690  
Fakss 00 45 96909691

**Preparāta izplatītājs Latvijā :** "Augu Aizsardzības Serviss" SIA, Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67553685, Latvija

**Nuance® 75 WG**  
**Herbicīds**

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Latvāņa ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.

**Darbīgā viela:** metil-tribenurons, 750 g/kg  
**Preparatīvā forma:** disperģējošas granulas  
**Reģistrācijas Nr. 0403**  
**Reģistrācijas klase:** 2  
**Iepakojums:** 100 g; 250 g; 500 g  
**Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma**  
**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma



**Uzmanību**

- |        |  |
|--------|--|
| H410   | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  |
| EUH208 | Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.   |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.  |
| P391   | Savākt izšļakstīto šķidrumu.   |
| P501   | Atbrīvojies no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.   |
| SP1    | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.   |
| SPe 3  | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.   |
| SPe 3  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Lai aizsargātu vel neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana**

Preparāts uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā un aizslēdzamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0° līdz +35°C.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:** Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, 4021 Linca, Austrija. Konsultācija Latvijā 27734868

**Ražotājs, tā adrese:** Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dānija  
Tel. 00 45 96909690  
Fakss 00 45 96909691

**Preparāta izplatītājs Latvijā:** "Augu Aizsardzības Serviss" SIA, Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67553685, Latvija

## **PIRMĀ PALĪDZĪBA**

Saindēšanās gadījumā darbs nekavējoties jāpārtrauc, un jāsažinās ar ārstu. Uzrādiet ārstam attiecīgo augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot vismaz 15 min ar lielu ūdens daudzumu un sazināties ar ārstu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, iedzert 100 ml ūdens. Nav ieteicams izraisīt vemšanu cietušajam.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu ārstam.

Informācijas ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

**Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473**

## **DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimds un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

## **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Nuance 75 WG ir herbicīds, kurš satur darbīgo vielu metil-tribenurons. Tas galvenokārt iedarbojas caur lapām, un tam ir neliela augsnes iedarbība (augi uzņem ar saknēm) un efektīvi ierobežo daudzas divdīgļlapju nezāles. Graudaugos Nuance 75 WG lieto pavasarī sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39). Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja miglo pa mazām, aktīvi augošām nezālēm. Jūtīgo nezāļu augšana tiek apturēta tūlīt pēc apstrādes. Nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas apmēram pēc 2 nedēļām. Tā kā lielākas nezāles kļūst mazāk jutīgas pret produktu, tad ir ļoti svarīgi zināt kādās nezāļu attīstības stadijās Nuance 75 WG iedarbojas vislabāk (skatīt tabulu).

Nuance 75 WG mazāko devu ieteicams lietot, kad nezāles ir aktīvi augošas un ir agrās attīstības stadijās- dīgļlapas līdz 4 īstās lapas, optimāls augsnes mitrums, gaisa relatīvais mitrums > 80% un spēcīga kultūraugu konkurence. Augstāka Nuance 75 WG deva nepieciešama, ja nezāļu ir daudz, augsne ir sausa un ir rets kultūraugu sējums. Lai nodrošinātu preparāta efektivitāti, vienmēr nepieciešams kvalitatīvs miglojums, lai ar darba šķidrumu tiktu noklātas visas nezāles.

Minimālā gaisa temperatūra apstrādei ar Nuance 75 WG ir 5°C.

**Ziemāju graudaugos** vislabāko efektivitāti var sasniegt, ja miglo agri pavasarī, tiklīdz nezāles atsāk augt. **Vasarāju graudaugos** vislabākie rezultāti tiek sasniegti nezālēm dīgstot, līdz 4 īsto lapu stadijai.

### Devas:

Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos: **15 g/ha**

Vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos: **12-15 g/ha**

**Nezāļu apkarošanas efektivitāte** ir atkarīga no nezāļu attīstības stadijas un to jutības pret metil-tribenuronu.

Nezāļu sugas	Nezāļu attīstības stadija		
	Līdz 2 īstajām lapām*	Līdz 6 īstajām lapām*	Līdz 15 cm augstas
Sinepe, tīruma ( <i>Sinapis arvensis</i> )	J	J	J
Virza, parastā ( <i>Stellaria media</i> )	J	J	J
Panātre, sārtā ( <i>Lamium purpureum</i> )	J	J	VR
Balanda, baltā ( <i>Chenopodium album</i> )	J	VJ	VJ
Neaizmirstule, tīruma ( <i>Myosotis arvensis</i> )	J	J	VJ
Matuzāle, ārstniecības ( <i>Fumaria officinalis</i> )	J	J	R
Aklis, parastais ( <i>Galeopsis tetrahit</i> )	J	J	VR
Kumelīte, tīruma ( <i>Matricaria spp.</i> )	J	J	J
Magone, zīda ( <i>Papaver rhoeas</i> )	J	J	R
Sūrene, blusu ( <i>Polygonum persicaria</i> )	J	J	VJ
Plikstiņš, ganu ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	J	J	VJ

\*J - jutīgas nezāles (efektivitāte>85%), VJ-vidēji jutīgas (efektivitāte 75 - 85%), VR-vidēji izturīgas (efektivitāte 60 - 75%), R-izturīgas (efektivitāte<60%).

**Nogaidīšanas laiks:** 60 dienas

Lai paplašinātu iedarbības spektru, Nuance 75 WG var izmantot tvertnes maisījumos ar citiem herbicīdiem, piemēram, **Saracen**. Saracen pievienošana tvertnes maisījumā nodrošinās labāku efektivitāti uz ķeraīņu madaru (*Galium aparine*), efejlapu veroniku (*Veronica hederifolia*) un parasto rudzupuķi (*Centaurea cyanus*).

Kultūraugs	Nuance 75 WG deva, g/ha	Saracen deva, l/ha
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi un tritikāle	15	0.075-0.1
Vasaras kvieši, vasaras mieži un auzas	12-15	0.075 – 0.1

### Virsmas aktīvā viela:

Lietojot Nuance 75 WG, darba šķidrumam var pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu (piem. Kontakts) 50 ml uz 100 litriem darba šķidruma, vai arī virsmas aktīvo vielu Hiwett (100 - 200 ml uz 200 L darba šķidruma).

### Mazais lietojums

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ceļa malas, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, zemes zem elektrolīniju pārvadiem	Latvāņi	15	<p>Apsmidzina:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģētācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu stadijā.</li> <li><u>lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģētācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs – 20 cm.</li> <li><u>lietošanas veids</u> Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to roretes ir diametrā ap 20 -25 cm.</li> <li>lietošanas veids Latvāņa cetrālo dzinumu ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās sēklas.</li> <li>lietošanas veids Atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Kontakts 100ml uz 200 l ūdens uz 1 ha.</li> </ol>	-	1

Labāku rezultātu sasniegšanai, jebkurā no lietošanas veidiem veido tvertnes maisījumu ar Accurate 200 WG.

Nuance 75 WG 15 g/ha + Accurate 200 WG 30 g/ha + 100 ml Kontakts (virsmas aktīva viela) uz 200 l ūdens uz 1 ha. Šādu apstrādi veic tikai vienu reizi veģetācijas periodā.

**Piezīme:** Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ieverot **10 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamajai zemei. Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ieverot **5 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamajai zemei.

**Bezlietus periods** - 2 stundas

**Darba šķidruma patēriņš:** 200 l/ha

**Kultūraugu izturība:** Nuance 75 WG var lietot lielākoties visām ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu šķirnēm. Zināms, ka never lietot auzu šķirnei 'Matilda'.

Šaubu gadījumā un pirms pielietot Nuance 75 WG jaunām šķirnēm, konsultējieties ar sēkļu firmas pārstāvjiem par šķirņu izturību pret metil-tribenuronu. Nelietot graudaugu sējumos ar tauriņziežu pasēju. Tauriņzieži pēc apstrādes ar Nuance 75 WG var tikt bojāti vai stipri aizkavēties to augšana.

## BRĪDINĀJUMI

Nelietot kultūraugiem, kas cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, zemu temperatūru radīta stresa, kaitēkļu un slimību bojājumiem vai mikroelementu deficīta.

Nelietot graudaugos ar stiebrzaļu, āboliņa, citu tauriņziežu, vai citu divdīgļlapju pasēju.

Nelietot produktu 7 dienu laikā pēc kultūrauga pievelšanās.

Nelietojiet Nuance 75 WG

-kad ir lielas diennakts temperatūru svārstības (zem 5°C un virs 25°C);

-laikā, kad paredzamas salnas;

-kad ir augstas temperatūras un liela saules intensitāte;

Pēkšņs sals neietekmē Nuance 75 WG efektivitāti, bet var apturēt uz laiku kultūraugu augšanu. Ļoti sausos laika apstākļos var samazināties efektivitāte tādām nezālēm kā piem. baltā balanda.

Jāievēro ļoti liela piesardzība, lai izvairītos no produkta nokļūšanas ārpus apstrādājamās platības uz blakus esošajiem ar lietojumu nesaistītajiem augiem vai ūdenstilpnēs.

Pilnīga miglotajā izmazgāšana pēc produkta lietošanas ir ļoti būtiska — skatīt sadaļu "Smidzinātāju un cita aprīkojuma tīrīšana".

Izvairieties no miglotāja darba gājienu pārsedes.

Nelietot šo produktu graudaugos secībā vai arī bākas maisījumos ar herbicīdiem, kuri satur ALS inhibitorus, izņemot secīgu metilflupīrsulfurona, metilflupīrsulfurona un etilkarfentrazona vai amidosulfurona darbīgās vielas saturošu herbicīdu lietošanu. Secīga lietošana pēc amidosulfurona ir pieļaujama vienīgi gadījumos, ja graudaugi ir sekojošā pēckultūra.

Smidzinātāja nepilnīgas izmazgāšanas rezultātā tiks nodarīts bojājums jutīgajiem kultūraugiem, kuri tiks migloti izmantojot šo nepilnīgi izmazgāto miglotāju.

## ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Laukā, kur pavasarī lietots Nuance 75 WG, pēc ražas novākšanas var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi, ja augsni apar vismaz 15 cm dziļi. Nākamā gada pavasarī var

sēt visus kultūraugus. Ja ar Nuance 75 WG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus. Pēc 3 mēnešiem pēc apstrādes var sēt tikai lauka pupas vai eļļas rapsi.

### **Augsnes un laika apstākļu ietekme uz produkta iedarbību**

Šo produktu var lietot jebkura tipa augsnēs. Sausās augsnēs var būt samazināta produkta efektivitāte. Vislabāko efektu sasniedz, ja produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas augsne augu sakņu zonā ir mitra.

## **REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA**

Nuance 75 WG satur metif-tribenuronu, kurš ir ALS inhibitors, un saskaņā ar HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikāciju ietilpst grupā B. Ja vienā laukā vairākus gadus atsārtoti lieto vienas un tās pašas iedarbības herbicīdus var izveidoties izturīgo nezāļu sugu populācijas, kurām pavairojoties, tās var kļūt izturīgas pret šādiem preparātiem. Nezāļu sugu uzskata par rezistentu pret herbicīdu, ja tā neiet bojā pēc apstrādes ar tā ieteikto devu. Rezistences veidošanos nezāļu sugas ietvaros var novērst vai aizkavēt, lietojot laukā atšķirīgas ietekmes herbicīdus vai lietojot maisījumā ar cita veida iedarbības herbicīdiem. Nelietot herbicīdus, kuru darbīgās vielas ir ALS inhibitori, kā vienīgo līdzekli divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai augsekā. Nelietot Nuance 75 WG maisījumā vai secībā ar citiem herbicīdiem, kuru darbīgās vielas ir ALS inhibitori. izņemot tos, kas minēti sadaļā „Brīdinājumi”.

## **SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM**

Nuance 75 WG var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos paredzētajiem preparātiem, kurus lieto attiecīgajā graudaugu attīstības stadijā. Neskaidrību gadījumā konsultējieties pie firmu pārstāvjiem. Gatavojot tvertnes maisījumu, miglotājā vienmēr pirmo pievieno Nuance 75 WG un pārlicinās, ka tas ir pilnībā izšķīdis, pēc tam, nepārtraukti maisot, pievieno citus preparātus.

## **DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA**

Vienmēr lietojiet rūpīgi izmazgātu smidzinātāju. Tvertni līdz pusei piepilda ar ūdeni, ieslēdz maisītāju un pievieno nepieciešamo Nuance 75 WG devu. Lai precīzi nomērītu vajadzīgo Nuance 75 WG daudzumu, izmanto produkta mērglāzīti. Nuance 75 WG viegli izšķīst ūdenī dažu minūšu laikā. Miglošanas un transportēšanas laikā darba šķidrumam nodrošina maisīšanu. Pagatavo darba šķidrumu tikai tūlītējai lietošanai.

## **SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA**

Lai novērstu citu kultūraugu bojājumus, kuri nav graudaugi, rūpīgi izmazgājiet visu smidzinātāju tiklīdz ir pabeigta smidzināšana.

Rīkojieties sekojoši:

- Pabeidzot smidzināšanu, atbrīvojiet smidzinātāja tvertni no darba šķidruma atlikuma. Nomazgājiet smidzinātāju no ārpusē ar tīru ūdeni.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertnes iekšpusi ar tīru ūdeni un izmiglojiet vismaz 1/10 daļu no tvertnes tilpuma caur smidzinātāja stieni un gumijas caurulēm. Iztukšojiet tvertni pilnībā. Skalojamo ūdeni var izmiglot uz tikko apstrādātajām platībām.
- Piepildiet līdz pusei smidzinātāja tvertni ar ūdeni un pievienojiet nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa (piem., All Clear Extra) daudzumu. Ieslēdziet maisīšanu un izsmidziniet caur smidzinātāja stieni un caurulēm mazgāšanas šķidrumu. Iepildiet



atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu līdz pilnai smidzinātāja tvertnei. Un uz 15 minūtēm atstājiet ieslēgtu mašīnu. Atkārtoti izsmidziniet caur smidzinātāja stieni un caurulēm. Tvertni pilnībā atbrīvojiet no skalojumā ūdens (ja nav iespējams pilnībā izskalot smidzinātāju, tad vēlreiz atkārtojiet 3. punktu)

- Noņemiet sprauslas un filtrus, un izmērcējiet tos spainī ar ūdeni, kuram pievienoti 50 ml All Clear Extra uz katriem 10 litriem.
- Vēlreiz izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un izsmidziniet vismaz 1/10 daļu no tvertnes tilpuma caur smidzinātāja stieni un caurulēm. Iztukšojiet tvertni pilnībā.

Lai atbrīvotos no skalojamā ūdens, sekojiet darba drošības instrukcijām attiecībā uz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu lauksaimniecības uzņēmumos. Skalojamo ūdeni izmiglojiet uz apstrādātajām platībām. Skalojamo ūdeni nedrīkst izmiglot uz jutīgiem kultūraugiem, vai uz laukiem, kuros vēlāk ir plānot jutīgu kultūraugu sēšana vai stādīšana.

## **TUKŠAIS IEPAKOJUMS**

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Preparāta iepakojums ir jāmazgā ar ūdeni 3 reizes, mazgājamais ūdens izmantojams darba maisījuma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## **VIDES AIZSARDZĪBA**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

**Piesārņotas augsnes attīrīšana.** Izbirošu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

## **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt 0°C līdz +35°C temperatūrā.

## **DERĪGUMA TERMIŅŠ**

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

## **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta lietošanas visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles.